Tiña Dermatofitosis

¿Qué es la tiña y qué la causa?

La tiña es una infección micótica cutánea que puede afectar a humanos y muchas especies animales. La infección también se llama dermatofitosis y la generan varios tipos de hongos. La enfermedad obtiene su nombre en inglés ("ringworm" - gusano anular) de la aparición de un sarpullido en forma circular que se desarrolla en la piel de la o animal infectado. enfermedad no tiene nada que ver con gusanos.

Algunos de los hongos que causan la tiña pueden encontrarse en humanos y, en ocasiones, en animales. Otros hongos se encuentran en animales y pueden transferirse a los humanos. Existen algunos hongos de tiña que encuentran en el suelo y, bajo las condiciones apropiadas, pueden afectar ya sea a los humanos o a los animales.

¿Qué tipo de animales pueden contraer tiña?

Muchas especies de animales pueden contraer tiña, incluyendo perros, gatos, ganado bovino, ovejas, cabras, cerdos, roedores, conejos y pájaros.

¿Cómo puede mi animal contraer tiña?

Los hongos que causan la tiña pueden vivir durante bastante tiempo como esporas infectivas y el contacto directo con estas esporas es la causa de esta enfermedad. Estas esporas pueden encontrarse en el pelo de un animal infectado o incluso en elementos usados sobre el animal como cepillos o máquinas para cortar el pelo. Su animal también puede contraer estos hongos mediante contacto directo con el suelo.

¿Cómo puede la tiña afectar a mi animal?

Luego de la exposición, tarda entre dos y cuatro semanas antes de que el

animal muestre signos clínicos. En algunas partes del cuerpo pueden perder el pelo y se pueden formar costras o escamas sobre la piel en las áreas afectadas. Con frecuencia, la piel en estas áreas se enrojece y pica muchísimo. En algunas ocasiones, los hongos que causan el problema morirán en el centro del área afectada, dejando la apariencia de un círculo o anillo en la piel de su animal. De allí es donde proviene el término en inglés "ringworm" (gusano anular).

¿Puedo contraer tiña?

Sí. Puede contraer la infección mediante contacto directo con un animal o persona infectada. síntoma más común es la picazón y general se placas por lo encuentran más inflamadas en los bordes enrojecimiento, con un descamación ocasiones, y, ampollas.

¿ A quién debo contactar si sospecho del contagio con tiña?

En el caso de animales - Contacte a su veterinario de inmediato.

En humanos – Contacte a su médico inmediatamente.



Es una enfermedad cutánea micótica que puede afectar varias especies animales y a los humanos.

La foto muestra lesiones cutáneas generadas por la tiña en un gato y su dueño.

¿Cómo puedo proteger a mi animal de la tiña?

La tiña se evidencia más seguido en animales con un sistema inmune débil o inmaduro. Los cachorros y gatitos deben mantenerse en un área limpia para reducir el riesgo de infecciones micóticas. Los animales infectados deben tratarse y separarse de otros animales. Cualquier animal con un sistema inmune debilitado enfermedades (por debido a otras ejemplo: cáncer, enfermedad renal) deben mantenerse alejados de animales infectados.

¿Cómo puedo protegerme de la tiña?

La mejor forma de protegerse de la tiña es aplicar buenos hábitos de higiene. frecuencia sus manos con especialmente luego de tener contacto con cualquier animal. Limpie y desinfecte las áreas en las cuales habita su animal así como también cualquier equipo usado para el animal. Se puede blanqueador de cloro diluido (1:10).

Si su animal se infecta, use guantes y ropas de protección cuando tenga contacto o realice el tratamiento del animal. Lave el área cuidadosamente luego del contacto. Pasar la aspiradora también ayuda. Si posee un sistema inmune debilitado manténgase alejado de cualquier animal o persona que se sepa que se encuentra infectado.

Para mayor información

Fichas técnicas de CFSPH. Dermatofitos

http://www.cfsph.iastate.edu/Diseas eInfo/default.htm

Sitio Web de CDC. Tiña en

http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/d iseaseinfo/ringworm.htm

