

Leishmaniasis

¿Qué es la leishmaniasis y qué la causa?

La Leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito protozoario llamado Leishmania. El parásito se transmite a los humanos y animales a través de la picadura de un flebótomo infectado. La enfermedad puede tener varias formas diferentes; las dos formas más comunes afectan la piel o los órganos internos.

La leishmaniasis tiene lugar en muchos países del mundo (el Mediterráneo, América Central y del Sur, Asia, África, el Medio Oriente, China, India, el Caribe). Los casos en los Estados Unidos son raros y por lo general ocurren en personas que retornan de países que tienen la enfermedad y los flebótomos. Sin embargo, los flebótomos capaces de transmitir la enfermedad se detectaron en la parte sur de Texas y se registró la ocurrencia de leishmaniasis en 21 estados y en Canadá.

¿Qué animales pueden contraer la leishmaniasis?

Los perros (especialmente foxhounds en la parte este de los Estados Unidos), coyotes, zorros y roedores pueden albergar el parásito y ser afectados. Los gatos y caballos pueden verse afectados en raras ocasiones.

¿Cómo puede mi animal contraer la leishmaniasis?

Los animales se infectan a través de la picadura de un flebótomo (vector) que se alimentó previamente de la sangre de otro animal infectado.

¿Cómo puede la leishmaniasis afectar a mi animal?

Los perros desarrollan la forma cutánea de la enfermedad y pueden evidenciar áreas sin sensibilidad, secas, con escamas y sin pelo en el hocico, alrededor de los ojos, orejas o en las patas. Las lesiones pueden comenzar en las almohadillas plantares y luego propagarse al resto del cuerpo.

Otros signos pueden ser fiebre, falta de energía, pérdida de apetito y peso e intolerancia al ejercicio.

¿Puedo contraer la leishmaniasis?

Sí. Los humanos pueden contraer la leishmaniasis pero no directamente de animales. La transmisión tiene lugar a través de la picadura de un flebótomo infectado (**vector**). Los animales son reservorios (o fuente del protozoo para los flebótomos). La mayoría de los casos suceden cuando las personas viajan a áreas en las cuales la enfermedad es endémica. Los signos de la enfermedad puede llevar meses en desarrollarse y pueden afectar la piel o los órganos internos del cuerpo.

La enfermedad cutánea comienza con protuberancias enrojecidas que pican y que pueden ulcerarse y formar costras. Con frecuencia sanan por sí solas pero puede permanecer durante años y causar cicatrices permanentes.

Cuando los órganos internos se ven involucrados, la enfermedad puede afectar el bazo, el hígado o generar cambios en la sangre. Esta forma puede ser muy grave si no se trata y puede resultar en la muerte.

Esta forma rara vez ocurre en los Estados Unidos.

¿A quién debo contactar si sospecho el contagio con leishmaniasis?

En animales –

Contacte a su veterinario.

En humanos –

Contacte a su médico.

¿Cómo puedo proteger a mi animal de la leishmaniasis?

Las mascotas, especialmente perros, que viven en áreas en las cuales existen flebótomos deben mantenerse en el interior de la vivienda desde el atardecer hasta el amanecer (a fin de evitar las picaduras de los insectos). Las poblaciones de roedores deben controlarse a fin de minimizar una fuente de protozoos para el flebótomo.

¿Cómo puedo protegerme de la leishmaniasis?

Si viaja a lugares en los cuales la leishmaniasis es endémica y existen flebótomos, limite sus actividades en exteriores desde el atardecer hasta el amanecer. Si está al aire libre, use vestimentas protectoras (pantalones largos y camisas de manga larga). Use repelentes de insectos que contengan dietiltoluamida. Si duerme al aire libre, use red mosquitera. Asegúrese de que las ventanas y puertas tengan persianas en buen estado de conservación.

Para mayor información

Fichas técnicas de CFSPH. Leishmaniasis en <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/>

Sitio Web de CDC. Leishmaniasis en <http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/leishmania/default.htm>

