

Enfermedad de Nipah

¿Qué es la enfermedad de Nipah y qué la causa?

La enfermedad de Nipah es una enfermedad viral recientemente descubierta (1999) que puede afectar tanto a humanos como a animales. Puede resultar en una enfermedad respiratoria severa, encefalitis, incluso la muerte. Los brotes de Nipah sólo se registraron en Asia Suroriental (es decir, Malasia, Singapur, India y Bangladesh).

¿Qué tipo de animales pueden contraer la infección con el virus Nipah?

Los cerdos constituyen la especie animal principal afectada por el virus Nipah. Los perros, cabras, gatos, caballos y posiblemente ganado ovino puedan infectarse. Se cree que el virus se mantiene en la naturaleza a través de los “zorros voladores” (tipo de murciélago frutero) que no muestran signos de infección.

¿Cómo puede mi animal contraer la enfermedad Nipah?

Los cerdos se infectan mediante el contacto o ingesta (**oral**) de objetos o materiales contaminados con la orina, heces o saliva de los zorros voladores (portador) infectados. El virus también puede propagarse entre los cerdos mediante **contacto directo** y mediante **aerosol**.

Otras especies animales se infectan al tener contacto con cerdos enfermos u objetos contaminados con el virus.

¿Cómo puede la Nipah afectar a mi animal?

Los cerdos infectados con el virus Nipah desarrollarán un patrón de respiración rápida y dificultosa. También pueden respirar con la boca abierta y tener una tos característica fuerte y áspera. La fiebre es común. El sistema nervioso puede verse también afectado, de modo tal que signos tales como temblores, espasmos musculares, cojera e incoordinación pueden detectarse. Puede tener lugar la muerte súbita.

¿Puedo contraer la Nipah?

Sí. La enfermedad en humanos puede variar entre no generar signos a causar la muerte. Por lo general, las personas contraen la infección mediante el contacto cercano con cerdos infectados. Los primeros síntomas son parecidos a los de la gripe, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Dichos síntomas pueden continuar junto con signos neurológicos como desorientación, mareos. Durante la epidemia de 1998-1999 en Malasia, el 40-50% de los casos en humanos culminaron en la muerte.

Los casos recientes de virus Nipah en Bangladesh se transmitieron de persona a persona luego de un contacto muy cercano con individuos infectados. Se cree que el brote comenzó inicialmente cuando niños comieron fruta contaminada con la saliva y la orina de los murciélagos fruteros.

¿A quién debo contactar si sospecho el contagio con Nipah?

En animales –

Contacte a su veterinario de inmediato.

En seres humanos –

Contacte a su médico inmediatamente.

¿Cómo puedo proteger a mi animal de la Nipah?

Los brotes de virus Nipah en cerdos sólo tuvieron lugar en Malasia y Singapur. Ya que el virus Nipah se descubrió recientemente, hay mucho que aprender todavía sobre dicho virus, incluyendo la forma que se transmite y el mejor método de prevención.

El mejor consejo de prevención en este momento es evitar que los cerdos tengan contacto con murciélagos fruteros y evitar que otros animales entren en contacto con cerdos infectados con el virus Nipah.

¿Cómo puedo protegerme de la Nipah?

En el caso de las personas, las mejores medidas de prevención es evitar el contacto con animales que pudiesen estar infectados con el virus Nipah. También deberá evitar comer fruta que pueda acarrear la contaminación con saliva u orine de los murciélagos fruteros.

Para mayor información

Fichas técnicas de CFSPH. Nipah en <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseasesInfo/default.htm>

Sitio Web de CDC. Enfermedad por el virus Nipah en <http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mpages/dispages/nipah.htm>

