

# Ectima contagioso

*Orf, boca costrosa, boqueras*

## ¿Qué es el ectima contagioso y qué lo causa?

El ectima contagioso también se conoce como boquera, boca costrosa y dermatitis pustular contagiosa.

Es una enfermedad viral que se encuentra a nivel mundial en países productores de ganado ovino. En los Estados Unidos, es más comúnmente visto en los estados occidentales (por ejemplo, Wyoming, Colorado, California y Texas).

Causa aftas y ampollas en los labios, morro, orejas y/o párpados de ovejas, cabras y otros animales. Los humanos también pueden verse afectados a través del contacto con animales infectados.

## ¿Qué tipo de animales pueden contraer el ectima contagioso?

El ectima contagioso se desarrolla en ovejas, cabras, alpacas, camellos y otros ruminantes salvajes. Se han registrado casos ocasionales en perros que comen animales muertos infectados.

## ¿Cómo puede mi animal contraer el ectima contagioso?

El virus se encuentra en lesiones cutáneas y costras de animales infectados y se cree que ingresa mediante **contacto directo** con cortes o abrasiones en la piel. El virus puede también propagarse mediante **fomites** (objetos inanimados, por ejemplo calzado, sogas, cepillos y otros materiales).

El virus es muy resistente en el ambiente. Puede permanecer en la lana y en el cuero durante aproximadamente un mes después de que las heridas han sanado, y se ha recuperado de las costras después de 12 años.


## ¿Cómo puede el ectima contagioso afectar a mi animal?

Los signos se detectan 2 a 3 días luego de la exposición de las ovejas y cabras al virus. Los primeros signos son pequeñas protuberancias elevadas (pápulas), llagas y ampollas en los labios, nariz, orejas y/o párpados. Los corderos lactantes pueden transmitir el virus a sus madres, lo cual genera lesiones en los pezones y en las ubres. Ya que estas lesiones pueden ser dolorosas, pueden generar la pérdida de apetito, reducción de peso o aún inanición. Se puede detectar salivación excesiva.

## ¿Puedo contraer el ectima contagioso?

Sí. El ectima contagioso en humanos se llama orf. Los signos se detectan, por lo general, entre 3 a 7 días luego de la exposición al virus. La exposición tiene lugar mediante el **contacto directo** con lesiones cutáneas o costras de los animales infectados.

En humanos, con frecuencia sólo se desarrolla una sola lesión cutánea. Por lo general, la herida sana por sí sola en 2 a 6 semanas sin dejar cicatrices.



**Ectima contagioso causa lesiones en el morro de ovejas y cabras.**

Foto de <http://www.smo.uhi.ac.uk>

## ¿A quién debo contactar si sospecho el contagio con ectima contagioso?

**En animales –**

Contacte a su veterinario.

**En humanos –**

Contacte a su médico.

## ¿Cómo puedo proteger mi animal del ectima contagioso?

Aísle los animales enfermos para limitar la exposición a otros. Limpie y desinfecte minuciosamente y con frecuencia las áreas en las cuales se mantienen los animales enfermos.

Se encuentran disponibles vacunas para algunos casos. Los animales vacunados recientemente deberán aislarse de aquellos que no están vacunados. Ya que la vacuna contiene el virus vivo modificado, los humanos deben ser cuidadosos al aplicarlas a los efectos de evitar el riesgo de infección.

## ¿Cómo puedo protegerme del ectima contagioso?

Lávese las manos con frecuencia luego de trabajar con animales. Utilice guantes descartables al manipular animales enfermos. Minimice el contacto con llagas tanto como sea posible. Tenga cuidado al administrar la vacuna.

## Para mayor información

Fichas técnicas de CFSPH. Ectima contagioso en

<http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/>